

GUÍA DEL MEDICAMENTO ELAHERE
(mirvetuximab soravtansina-gynx)
inyectable, para uso intravenoso

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre ELAHERE? ELAHERE puede causar efectos secundarios graves, como por ejemplo:

- **Problemas oculares.** Los problemas oculares con ELAHERE son frecuentes y además pueden ser severos. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si presenta algún problema ocular durante el tratamiento con ELAHERE, como por ejemplo visión borrosa, ojos secos, sensibilidad a la luz, dolor ocular o aparición o agravamiento de alteraciones de la visión.
 - Su proveedor de atención médica la enviará a un profesional de la salud ocular para que le revise los ojos antes de comenzar el tratamiento con ELAHERE, durante el tratamiento con ELAHERE y cuando sea necesario en caso de agravamiento de signos y síntomas de problemas oculares.
 - Antes de que comience su tratamiento con ELAHERE y durante dicho tratamiento, su proveedor de atención médica le recetará gotas oculares de corticoesteroides y lubricantes. Usted deberá usar las gotas oculares tal como se lo indique su proveedor de atención médica.
 - No utilice lentes de contacto durante el tratamiento con ELAHERE, a menos que su proveedor de atención médica le diga que los use.

En "**¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ELAHERE?**" encontrará más información sobre los efectos secundarios.

¿Qué es ELAHERE?

ELAHERE es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar a mujeres adultas con cáncer de ovario, cáncer de trompas de Falopio o cáncer peritoneal primario con positividad para el receptor del folato alfa y que:

- no respondieron a una quimioterapia con platino o dejaron de responder a dicho tratamiento y
- han recibido con anterioridad entre 1 y 3 tipos de quimioterapia.

Su proveedor de atención médica le hará un análisis para comprobar que ELAHERE es adecuado para usted.

Se desconoce la eficacia y la seguridad de ELAHERE en los niños.

Antes de recibir ELAHERE, informe a su proveedor de atención médica sobre todos sus problemas médicos, incluido lo siguiente:

- Si tiene problemas oculares o de visión.
- Si tiene problemas de hígado.
- Si está embarazada o tiene previsto embarazarse. ELAHERE puede perjudicar al feto. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si se embaraza o cree que podría estar embarazada durante el tratamiento con ELAHERE.

Mujeres capaces de embarazarse:

- Su proveedor de atención médica deberá hacerle una prueba de embarazo antes de que usted comience el tratamiento con ELAHERE.
- Usted deberá usar una anticoncepción eficaz durante el tratamiento y en los 7 meses posteriores a la última administración de ELAHERE.
- Si está amamantando o tiene previsto amamantar. Se desconoce si ELAHERE pasa a la leche materna. Usted no deberá amamantar durante el tratamiento ni en el mes posterior a la última administración de ELAHERE.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tome, ya sean de venta con receta, de venta sin receta, vitaminas o suplementos herbales. Tomar ciertos medicamentos durante el tratamiento con ELAHERE podría causar efectos secundarios.

¿Cómo recibirá ELAHERE?

- Le administrarán ELAHERE por infusión intravenosa (IV, es decir, en una vena).
- Antes de cada administración de ELAHERE recibirá medicamentos para prevenir las náuseas, los vómitos y las reacciones relacionadas con la infusión.
- ELAHERE se suele administrar cada 3 semanas (ciclo de 21 días). Su proveedor de atención médica decidirá qué tantos ciclos necesita usted.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ELAHERE?

ELAHERE puede causar efectos secundarios graves, como por ejemplo:

- Consulte el apartado “¿Qué es lo más importante que debo saber acerca de ELAHERE?”
- **Problemas pulmonares (neumonitis).** ELAHERE puede causar una inflamación pulmonar severa o potencialmente mortal que puede provocar la muerte. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si le aparecen o se le agravan síntomas como dificultad para respirar, falta de aliento, tos o dolor en el pecho.
- **Neuropatía periférica.** Durante el tratamiento con ELAHERE podría presentar un problema nervioso llamado neuropatía periférica. Su proveedor de atención médica la vigilará por si aparecen signos y síntomas de problemas nerviosos. Informe a su proveedor de atención médica si nota debilidad muscular o entumecimiento u hormigueos en las manos o los pies, o si se le agravan esos síntomas.

Los efectos secundarios más frecuentes de ELAHERE son:

- cansancio
- cifras elevadas de enzimas hepáticas en la sangre
- náuseas
- dolor abdominal (en la zona del estómago)
- cifras sanguíneas disminuidas de glóbulos rojos o glóbulos blancos
- diarrea
- cifra sanguínea disminuida de albúmina
- estreñimiento
- cifra sanguínea disminuida de magnesio

Si usted presenta ciertos efectos secundarios, es posible que su proveedor de atención médica le cambie la dosis de ELAHERE, aplase el tratamiento o lo retire por completo.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ELAHERE.

Llame a su médico si desea consejos médicos sobre los efectos secundarios. Puede notificar efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de ELAHERE.

A veces los medicamentos se recetan para fines diferentes de los indicados en esta guía del medicamento. Si desea más información sobre ELAHERE, hable con su proveedor de atención médica. Puede pedirles a su farmacéutico o a su proveedor de atención médica que le den la información sobre ELAHERE que se preparó para los profesionales de la salud.

¿Cuáles son los ingredientes de ELAHERE?

Principio activo: mirvetuximab soravtansina-gynx

Ingredientes inactivos: ácido acético glacial, polisorbato 20, acetato de sodio, sacarosa, agua para inyectables.

Fabricado por: ImmunoGen, Inc., Waltham, MA 02451

Licencia estadounidense 2288

ELAHERE™ es una marca comercial de ImmunoGen, Inc.

©2022 ImmunoGen, Inc.

Si desea más información, visite www.immunogen.com o llame al 1-833-486-4646.